(a)
Baseline peripheral-blood AEC
≤ 0.27 x 10⁹ cells/L
> 0.27 x 10⁹ cells/L
OS (%)
Log−rank
p = 0.097
days
Number at risk
> 0.27 x 10⁹ cells/L 6 6 4 1 0
≤ 0.27 x 10⁹ cells/L 30 24 13 3 0
(b)
Peripheral-blood AEC before the 4th infusion
≤ 0.18 x 10⁹ cells/L
> 0.18 x 10⁹ cells/L
OS (%)
Log−rank
p = 0.0032
days
Number at risk
≤ 0.18 x 10⁹ cells/L 19 18 12 3 0
> 0.18 x 10⁹ cells/L 11 8 5 1 0
(c)
Baseline serum levels of ECP
≤ 11.08 ng/mL
> 11.08 ng/mL
OS (%)
Log−rank
p = 0.088
days
Number at risk
≤ 11.08 ng/mL 10 9 6 2 0
> 11.08 ng/mL 29 23 12 2 0
(d)
ECP serum levels before the 4th infusion cycle
≤ 8.88 ng/mL
> 8.88 ng/mL
OS (%)
Log−rank
p = 0.19
days
Number at risk
≤ 8.88 ng/mL 6 6 5 2 0
> 8.88 ng/mL 33 26 13 2 0
(e)
Baseline serum levels of EPX
≤ 4.29 ng/mL
> 4.29 ng/mL
OS (%)
Log−rank
p = 0.03
days
Number at risk
> 4.29 ng/mL 8 8 6 1 0
≤ 4.29 ng/mL 31 24 12 3 0
(f)
EPX serum levels before the 4th infusion cycle
≤ 3.61 ng/mL
> 3.61 ng/mL
OS (%)
Log−rank
p = 0.021
days
Number at risk
> 3.61 ng/mL 9 9 6 1 0
≤ 3.61 ng/mL 30 23 12 3 0