Spectroscopic Characterization and Cytotoxicity Assessment towards Human Colon Cancer Cell Lines of Acylated cycloartane glycosides from *Astragalus boeticus* L.

Vittoria Graziani¹, Assunta Esposito¹, Monica Scognamiglio^{2,*}, Angela Chambery¹, Rosita Russo¹, Fortunato Ciardiello³, Teresa Troiani³, Nicoletta Potenza¹, Antonio Fiorentino^{1,4,*}, Brigida D'Abrosca^{1,4}

- ¹ Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF), Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", via Vivaldi 43 I-81100, Caserta, Italy; <u>vittoria.graziani@unicampania.it</u> (V.G.); <u>assunta.esposito@unicampania.it</u> (A.S.); <u>angela.chambery@unicampania.it</u> (A.C.); <u>rosita.russo@unicampania.it</u> (R.R.); <u>nicoletta.potenza@unicampania.it</u> (N.P.); <u>antonio.fiorentino@unicampani.it</u> (A.F.); <u>brigida.dabrosca@unicampania.it</u> (B.D.A)
- ² Department of Biochemistry, Max Planck Institute for Chemical Ecology Beutenberg Campus, Hans-Knöll-Straße 8 D-07745 Jena, Germany; <u>mscognamiglio@ice.mpg.de</u>
- ³ Dipartimento di Medicina di Precisione, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" Via Pansini, 5, 80131, Napoli, Italy; <u>fortunato.ciardiello@unicampania.it</u> (F.C.); <u>teresa.troiani@unicampania.it</u> (T.T.)
- ⁴ Dipartimento di Biotecnologia Marina, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, Naples 80121, Italy

*Correspondence: <u>mscognamiglio@ice.mpg.de</u> (M.S.), <u>antonio.fiorentino@unicampania.it</u> (A.F.); Tel.: +49 (0) 3641 5701609 (M.S.), +39 (0) 823 274576 (A.F.)

Supplementary material





Figure S2: ¹³C NMR spectrum of compound **1**





Figure S4: HSQC spectrum of compound 1





Figure S5: CIGAR-HMBC spectrum of compound 1



Figure S6: H2BC spectrum of compound 1



Figure S7: HSQCTOCSY spectrum of compound 1

Figure S8: ESI QTOF spectrum of compound 1







Figure S10: cytotoxicity of AS-IV in comparison with compound 3 and 4

A Cytotoxic activity of AS-IV and the active compound 4 at 2, 3 and 5 μ M (graph on the left) in HT-29 cell line. Cytotoxic activity of AS-IV and the inactive compound 3 at 30, 50 and 70 μ M (graph on the right) in HT-29 cell line.

B Cytotoxic activity of AS-IV, compound **3** and **4** at 30, 50 and 70 μ M in Caco-2 cell line (graph on the left). Figure legend on the right.





Α