

C₆₀ bioconjugation with proteins: towards a palette of carriers for all pH ranges

Matteo Di Giosia^{*} ¹, Francesco Valle ², Andrea Cantelli ¹, Andrea Bottoni ¹, Francesco Zerbetto ¹ and Matteo Calvaresi ^{1,*}

¹ Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Università di Bologna, V. F. Selmi 2, 40126 Bologna, Italy;

² Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (CNR-ISMN), Consiglio Nazionale delle Ricerche, via P. Gobetti 101, 40129 Bologna, Italy; f.valle@ismn.cnr.bo.it



Figure S1. Pepsin binding pocket 1 – C_{60} interactions. $\Delta G_{\text{binding}}$ decomposed per residue.



Figure S2. Pepsin binding pocket 2 – C_{60} interactions. $\Delta G_{\text{binding}}$ decomposed per residue.




Figure S3. Trypsin – C_{60} interactions. $\Delta G_{\text{binding}}$ decomposed per residue.




Figure S4. UV-visible spectra of C₆₀@pepsin (after synthesis - black line; after 3 months – blue line) and C₆₀@trypsin (after synthesis - green line; after 3 months – red line).